

Binsenastrild

<i>Ordnung:</i>	Sperlingsvögel (Passeriformes)
<i>Unterordnung:</i>	Singvögel (Passeri)
<i>Familie:</i>	Prachtfinken (Estrildidae)
<i>Gattung:</i>	Sonnenastrilde (<i>Neochmia</i>)
<i>Art:</i>	Binsenastrild



Als nächster Verwandter des Binsenastrilds gilt der Sonnenastrild, mit dem er in der englischsprachigen Literatur gemeinsam in die Gattung der Sonnenastrilde gestellt wird. Der Binsenastrild unterscheidet sich jedoch in seinem Erscheinungsbild und in seinem Verhalten so signifikant vom Sonnenastrild, dass er mitunter in eine eigene Gattung *Bathilda* eingeordnet wird. Das ist die Zuordnung, der Horst Bielfeld in seinem deutschsprachigen Standardwerk zu den Prachtfinken gefolgt ist. Dieser Artikel folgt dagegen der im englischsprachigen Raum üblichen Zuordnung in die Gattung der Sonnenastrilde. Eine Verwandtschaft unterstellt man außerdem mit den Zebrafinken und den Zeresfinken.

Es werden zwei Unterarten des Binsenastrilds unterschieden: *Neochmia ruficauda ruficauda* stellt die Nominatform dar und ist (bzw. war) im Osten Australiens beheimatet. Diese Unterart ist extrem selten oder bereits ausgestorben.

Neochmia ruficauda clarescens, der der Nominatform in Größe und Färbung gleicht. Bei dieser Art sind jedoch die Farben intensiver. Er ist im Norden und Nordwesten von Queensland sowie im Norden und Nordwesten Westaustraliens beheimatet. Ihr Wildbestand ist im 20. Jahrhundert extrem zurückgegangen.