

# Reisfink

<i>Ordnung:</i>	Sperlingsvögel (Passeriformes)
<i>Unterordnung:</i>	Singvögel (Passeri)
<i>Familie:</i>	Prachtfinken (Estrildidae)
<i>Gattung:</i>	Reisfinken ( <i>Padda</i> )
<i>Art:</i>	Reisfink



## **Erscheinungsbild**

Der Reisfink hat eine Körperlänge von 14 Zentimetern. Das Gefieder an der Körperoberseite und der Brust ist blaugrau. Die Kopfoberseite sowie der oberste Teil der Kehle sind schwarz; auffällig sind die großen weißen Wangenflecken und der sehr starke Schnabel. Der Schnabel ist zweifarbig.

Schnabeloberseite und -unterseite sind kräftig rot, während die Schnabelscheiden von hellerer Farbe sind und die Schnabelspitze weißlich ist. Die Augen sind braun und von einem hellroten Ring umgeben.

Es besteht kein ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus. Weibchen und Männchen sind am sichersten daran zu unterscheiden, dass nur das Männchen singt.

## **Verbreitungsgebiet**

Der Reisfink kam ursprünglich nur auf Java und Bali vor. Heute ist er auch auf Sumatra, den Molukken, Malaysia, im Süden Indochinas und Taiwan zu finden. Populationen leben auch an der ostafrikanischen Küste und auf Sansibar und St. Helena. Während er in seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet auf Java und Bali recht selten ist, hat die Verbreitung durch den Menschen das Überleben als Art sichergestellt.