

# Strohsittich

*Platycercus flaveolus*



## **Beschreibung:**

Länge: 33 cm

Männchen: strohgelb, Stirnband rot, Wangen, Flügelsäume und äußere Schwanzfedern blau, Schwanzunterseite hellblau, Rückenfedern schwarz mit gelben Säumen, Schulterfleck schwarz. Schnabel grauweiß, Iris braun, Beine dunkelgrau.

Weibchen: Kopf und Schnabel kleiner als beim Männchen, manchmal etwas orangerot an Hals und Brust, Stirnband weniger farbintensiv. Meistens mit weißem Unterflügelstreifen.

Jungvögel: Kopf und Unterseite grüngelb, Rücken und Flügel grün, weißer Unterflügelstreifen. Rotes Stirnband schmäler als bei ausgewachsenen Sittichen. Volle Ausfärbung mit ca. 14 Monate

## **Freileben:**

Der Strohsittich lebt paarweise und in kleinen Gruppen. Er lebt mehr auf Bäumen als andere Plattschweifsittiche und ist auch scheuer. Er ist eng an Flüsse gebunden, vor allem während der Brutzeit. Strohsittiche sind Standvögel und halten sich immer in den gleichen Regionen auf. Die Nahrung, die sie vorwiegend am Boden suchen, besteht hauptsächlich aus Samen, Früchten, Blüten, Beeren, Nüssen und Insekten. Während der Nahrungsaufnahme zwitschern sie leise. Der Flug ist schnell und wellenförmig, er ähnelt dem des Gelbbauchsittichs. Während des Fluges verständigen sie sich mit dreisilbigen pfeifenden Kontaktrufen. Ihr Alarmruf besteht aus einem schrillen Kreischen. Brutzeit August bis Januar. Die Bruthöhlen befinden sich in hohlen Ästen oder Bäumen, vorwiegend in Eukalyptusbäumen in der Nähe von Flüssen und Wasserstellen. Das Gelege, das aus 4-5 Eiern besteht, wird ca. 22 Tage bebrütet. Das Weibchen brütet alleine. Im Alter von 5 Wochen fliegen die Jungvögel aus. Sie bleiben noch einige Zeit bei ihren Eltern.