

Zwergwachtel

<i>Ordnung:</i>	Hühnervögel (Galliformes)
<i>Familie:</i>	Fasanenartige (Phasianidae)
<i>Gattung:</i>	Erdwachteln (<i>Coturnix</i>)
<i>Art:</i>	Zwergwachtel



Verbreitungsgebiet

Zwergwachteln sind in Afrika von Sierra Leone und Äthiopien bis nach Sambia und Natal sowie auf der indischen Halbinsel, in Birma, Thailand, Taiwan, China, Borneo, den Nikobaren und den Philippinen, Java, Lombok, Flores, Timor, Sumatra, Neuguinea und Australien beheimatet. Innerhalb dieses großen afroasiatischen Verbreitungsgebietes haben sie 10 Unterarten ausgebildet. So lebt beispielsweise *C.c.novaeguineae* in den Bergtälern Zentral-Neuguineas bis zu einer Höhe von 2.200 Metern, und *C.c. lipida* ist nur auf dem Bismarck-Archipel zu finden.

Die Nominatform ist *C.c. chinensis*, die von Indien über Thailand und Indochina bis ins südöstliche China verbreitet ist.

Lebensraum

Zwergwachteln bewohnen dichtes, feuchtes Grasland auf Ebenen und Gebirgen. Trittpfade durchziehen tunnelartig das Gras ihrer Reviere. In Afrika, wo Zwergwachteln eher sporadisch auftreten, sind sie in Gebirgen bis zu 1.800 Meter Höhe zu finden. In unregelmäßigen Wanderbewegungen passen sie sich dabei den Regenzeiten an. So beginnt in Nigeria die Brutzeit der Zwergwachteln auf dem Höhepunkt der Regenzeit. Sobald die Jungvögel flügge sind, verlassen sie dagegen die Region.